

德必保胃腸藥錠

Groskyu Tablets

衛署藥輸字第025345號

含5種健胃生藥、2種消化酵素、利膽劑、
3種制酸劑、甘草萃取物

德必保胃腸藥錠Groskyu Tablets含有5種健胃生藥、2種消化酵素、利膽劑、制酸劑、甘草萃取物等成分，為西藥及生藥調製而成的胃腸藥。

本品含有

●健胃生藥

Fennel、Coptis Rhizome、Cinnamon Bark、Gentian、Clove 5種生藥會促進消化液的分泌。

●消化酵素

Diastase及Lipase 2種消化酵素，有助於糖類、蛋白質、脂質的消化。

●利膽劑

Ursodeoxycholic Acid可促進分泌膽汁，有助於脂肪的消化。

●制酸劑

Sodium Bicarbonate、Precipitated Calcium Carbonate、Magnesium Aluminometasilicate 3種制酸劑，可中和過多的胃酸。

●Glycyrrhiza Extract

甘草生藥萃取物可保護受損的胃黏膜。

【有效成分及含量】1錠中含有下列成分：

Sodium Bicarbonate	60mg
Precipitated Calcium Carbonate	20mg
Magnesium Aluminometasilicate	16.67mg
Ursodeoxycholic Acid	2.67mg
Diastase	4mg
Lipase	6mg
Glycyrrhiza Extract (=Glycyrrhiza)	4.8mg 37.5mg)
Powdered Fennel	8mg
Powder Coptis Rhizome	3.33mg
Powder Cinnamon Bark	8mg
Gentian Extract (=Gentian)	0.27mg 2.67mg)
Powder Clove	4mg

其他成分(賦形劑)：Powdered Chlorella、Microcrystalline Cellulose、Carmellose Calcium、Magnesium Stearate

【用途(適應症)】

緩解胃部不適、胃酸過多、健胃、幫助消化。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- (一)正在使用其他腸胃藥者。
- (二)曾因本藥成分引起過敏的人。
- (三)正在接受透析治療的人。
- (四)未滿6歲之幼童。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (一)消化道潰瘍的人。
- (二)有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。
- (三)排尿困難者、青光眼、甲狀腺功能失調。
- (四)有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感的人。
- (五)有腎臟疾病的人(因本藥每日最大建議使用量之含鎂量超過50mEq(0.6g))。
- (六)須限鹽飲食的人(因本藥每日最大建議使用量之含鈉量超過50mEq(0.115g))。
- (七)腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用)。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (一)目前正在接受醫師治療的人。
- (二)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (三)老年人。
- (四)使用者本人或家人有過敏體質者。
- (五)與其他藥品併用時。
- (六)曾因使用藥品發生過敏的人。

四、其他使用上注意事項：

- (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二)避免陽光直射。
- (三)勿超過建議使用量，務必遵照本說明書之用法用量。
- (四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
- (五)如長期服用或長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- (六)腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒：會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
- (七)可能引起腹脹、打嗝。
- (八)孩童必須在父母監督下才能服用。

【儲存上之注意】

- 一、避免日光直射，宜密封保存於陰涼乾燥之處。
- 二、請保管於小孩伸手不可及之處。
- 三、防止誤用及維護品質請勿換容器保存。
- 四、請勿服用過期之藥品。
- 五、為了確保品質，容器蓋一經開啓後，請於六個月內使用完畢。

【用法用量】請於3餐飯後，配溫水或白開水服用下列1次用量。

年齡	15歲以上及成人	12-15歲	6-12歲
1次量	5 錠	4 錠	2 錠
服用次數	每日3次於餐後配溫水或白開水服用		

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉
皮膚	起疹子、發紅、發癢
其他	偶有過敏

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有任何不適情況產生。
- (二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善時。

【臨床試驗】

依據一項5年隨機雙盲之臨床研究顯示，ursodeoxycholic acid 以建議治療劑量(13-15 mg/kg/d)的2倍(28-30 mg/kg/d)治療原發性硬化性膽道炎(primary sclerosing cholangitis)之病人(共納入150位)，結果顯示，用藥組發生臨床事件(死亡、肝臟移植或minimal listing criteria)的風險為對照組的2.1倍(p<0.05)，也有較高發生嚴重不良事件的風險(包括靜脈曲張、肝硬化及膽道癌，63% vs. 37%，p<0.01)，此臨床試驗顯示，使用本品肝功能指數雖降低，但反而增加臨床事件風險。

【包裝】30-1000錠玻璃瓶裝

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【保存期限】標示於外盒

【儲存上的注意】25℃以下

【製造廠】DAISHO PHARM. CO. LTD.

【藥商】嵩平貿易有限公司

NO. 168, OHARAICHI, KOKA-CHO,

高雄市三民區民壯路65號5樓

KOKA-SHI SHIGA JAPAN