

1501-AHI

速佑寶能妥舒乳膏

SUYOUBAO NETOSU CREAM

スキントール S

衛署藥輸字第025085號
醫師藥師藥劑生指示藥品

【特性】

在日常生活中常被蚊子、跳蚤、塵蟎等蟲類咬傷時，患部會紅腫、癢或疼痛。起因於組織胺(Histamine)、血清素(Serotonin)、乙酰膽鹼(Acetylcholine)等的化學物質所引起的過敏反應之一種。

SUYOUBAO NETOSU速佑寶能妥舒乳膏含可抑制組織胺之Diphenhydramine及緩和癢、疼痛的Methyl Salicylate成分。

【有效成分及含量】 Each 1GM Contains : (每1公克中含)

Diphenhydramine 10mg
l-Menthol 50mg
dl-Camphor 60mg
Methyl Salicylate 30mg

其他成分(賦形劑)：

Liquid Paraffin、Cetanol、White Beeswax、Propylene Glycol、Glyceryl Monostearate、Self-emulsifying Type、Carboxyvinyl Polymer、Macrogol 1500、Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil 60、Tocopherol Acetate、Xanthan Gum、Sodium Hydroxide、Butyl Parahydroxybenzoate、Methyl Parahydroxybenzoate、Purified Water

【用途(適應症)】

皮膚癢、蕁麻疹、蟲咬傷、過敏性皮膚炎。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (二) 曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一) 深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一) 正在接受醫師治療的人。
 - (二) 本人或者其家屬有過敏體質的人。
 - (三) 曾經因藥品而引起過敏症狀的人。
 - (四) 2歲以下兒童。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一) 請遵守用法用量。
 - (二) 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。萬一不小心塗到時，請馬上以清水或溫水清洗。如症狀嚴重時請立刻到眼科醫師就診。
 - (三) 用於兒童時，請在家長保護監督下使用。
 - (四) 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
 - (五) Methyl Salicylate不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。
 - (六) 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
 - (七) 請避免日光直射，宜放置於乾燥陰涼之處(25°C以下)。
 - (八) 為防止兒童誤食，請放置於孩童伸手不及之處，妥善保管。
 - (九) 請勿換容器。(防止誤用及維護品質)
 - (十) 請勿使用過期製品。及在期限內開封後，為維護品質請儘早使用完。

【用法用量】

於患部清潔後，1日2~3次適量擦抹或因應症狀以適量塗於紗布再貼於患部。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

(一) 使用後，出現以下症狀時

身體部位	副作用
皮膚	紅斑、搔癢、刺痛感
其他	水楊酸反應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 使用5~6天後症狀仍無改善時。

(二) 若有任何不適情況產生。

【包裝】1000公克以下鋁管裝

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲藏溫度】25°C以下

【藥商】嵩平貿易有限公司

【製造廠】Yukinmoto Honten Co.,Ltd

高雄市三民區民壯路65號5樓

182,183,184,Otani-cho,Kashihara City
Nara,Japan